


Lat

Q King

Cajita



Vetőmagvizsgáló Labor

Vetőmagvizsgáló laborunk akkreditált státuszt kapott, ami azt jelenti, hogy az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak megfelelő működésünket a Nemzeti Akkreditációs Hivatal elismerte.

Ezen státusz alapján nemzeti jogszabályaink felhatalmazásával a Lajtamag Kft. átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatra is jogosult lesz a NÉBIH engedélye alapján.

Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon első magyar tulajdonban lévő családi vállalkozásként lehetőséget tudunk biztosítani arra partnereinknek, hogy vetőmag-mintáikat megvizsgáljuk, és a kapott vizsgálati eredményeket a vetőmagminősítő hatóság (NÉBIH, kormányhivatal) elfogadottnak tekintse, majd ezek alapján hivatalos vetőmagminősítő bizonyítványt állíttson ki.

Amit ezáltal Partnereinknek garantálni tudunk a hozzánk eljuttatott hiteles, hivatalos vagy magánmintával kapcsolatban:

- a minta beérkezését követően 24 órán belül a tisztaságvizsgálat megtörténik, illetve
- a csírázóképeségi vizsgálat (továbbá egyéb vizsgálatok) elkezdődnek, és
- ezen vizsgálatok eredményeit haladéktalanul a NÉBIH felé továbbítjuk, hogy a vetőmag termékük minél hamarabb forgalomba kerülhessen.

Emellett átruházott jogkörben valamennyi szántóföldi növényfajra „Megbízott (szántóföldi) ellenőr” és „Megbízott mintavevő” státusszal rendelkezünk.

Növényfajok, melyekből beküldött mintát tudunk fogadni:

- Árpa (*Hordeum vulgare*)
- Búza (*Triticum aestivum*)
- Durum búza (*Triticum turgidum*)
- Fehér mustár (*Sinapis alba*)
- Homoki zab (*Avena strigosa*)
- Kukorica (*Zea mays*)
- Mézontófű (*Phacelia tanacetifolia*)
- Napraforgó (*Helianthus annuus*)
- Olajretek (*Raphanus sativus* v. ol.)
- Pohánka (*Fagopyrum esculentum*)
- Repcefélék (*Brassica napus* v. ol.; *Brassica rapa*)
- Rozs (*Secale cereale*)
- Triticale (x *Triticosecale*)
- Zab (*Avena sativa*)

Köszöntjük a minőségi vetőmagok világában!



Seiwerth Anna és
Seiwerth Márton
tulajdonosok

lajtamag.hu

A siker magvai

Harmadik generációs családi vállalkozásunk élén édesapánk és nagyapánk örököseként értékes hagyatékot vettünk át.

Büszkék vagyunk rá, hogy több mint három évtizede, 1991 óta foglalkozunk vetőmagok termeltetésével, feldolgozásával és forgalmazásával. Ez a tapasztalat, mint ahogy munkatársaink szaktudása és állandóan fejlesztett technológiai megoldásaink garanciát jelentenek partnereinknek termékeink és szolgáltatásaink minőségére.

A tradíciók megtartása mellett folyamatosan újítunk, valamint törekszünk a fenntarthatóságra és a környezettudatos működésre.

A Lajtamag az innováció területén mindig is az élén járt, szakmai körökben köztudott, hogy a kutatás-fejlesztés terén zászlóshajónk többek között a zöldtrágya és a szója.

Ebben a fajtakatalógusban teljeskörűen felsorakoztatjuk az aktuális termékpalettánkat. Bemutatunk továbbá néhány újdonságot, amelyeket sokéves tapasztalatunk felhasználásával a mai trendek követelményeinek megfelelően fejlesztettünk ki.

Munkánkat a hatékonyság és a korrektség fémjelzi, bízunk benne, hogy ezt partnereink is méltányolják!



AKG

Zöldtrágya keverékek



Bővebb
információkat
találhatsz
honlapunkon
Zöldtrágya
keverékeinkről



Gazdaságos zöldítő páros

Javasolt vetésidő:



Augusztus – szeptember

Javasolt vetésnorma kg/ha: 15 20 25 30 35

Tenyészdő: 60-90 nap

Hatás: (téli) talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Utóvetemény: kukorica, szója, napraforgó

Elővetemény: kalászos

Vetési mélység: 2-3 cm sorvetőgéppel | 20kg

szórva vetés esetén is javasolt a sekély bedolgozás | 30kg

Összetétel:

- 70% mustár
- 30% olajretek

Jellemzők:

- Gyors növekedésű keverék
- Gyors talajtakaró, jó gyomelnyomó képesség
- Téli kifagy
- Nagy gyökér- és zöldtömeget ad (40-50 t/ha)

- Előveteményként szója, napraforgó vagy kukorica elé
- Kifejezetten tömörödött és/vagy szervesanyagban szegény talajokra ajánlott
- Repce elé / repce után ne vessük!

Terminálás:

Rendelkezésre álló munkagép, hasznosítási cél szerint. Kifagyás/ mechanikai. Hagyományos zöldtrágyaként virágzás elején (október vége) bedolgozható, vagy akár zúzható, mulcsként a területen hagyható beforgatás nélkül.

Növényvédelem:

Nem termelő célú takarónövény állományt nem célszerű és nem gazdaságos növényvédő szerrel kezelni. Herbiciddel végrehajtott terminálásra nincs szükség.



Takarékos zöld

Javasolt vetésidő:



Augusztus – szeptember

Javasolt vetésnorma kg/ha: 15 25 30 35 40

Tenyészdő: 60-90 nap

Hatás: (téli) talajtakarás, erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Utóvetemény: kukorica, napraforgó

Elővetemény: repce, kalászos

Vetési mélység: 2-3 cm sorvetőgéppel | 30kg

szórva vetés esetén is javasolt a sekély bedolgozás | 35kg

Összetétel:

- 76% rozs
- 4% facélia
- 20% bíborhere

Jellemzők:

- Kései vetésre alkalmas
- Áttelelő keverék
- Javítja a talaj vízháztartását, C:N arányát
- Nagy biomasszázt képez

- Kiváló tápanyagmegőrző képességgel rendelkezik
- Jól hasznosítható zöld takarmánynak is
- Könnyen talajba dolgozható tavasszal is

Terminálás:

Kémiai /mechanikai.

Növényvédelem:

Nem termelő célú takarónövény állományt nem célszerű és nem gazdaságos növényvédő szerrel kezelni. Herbiciddel végrehajtott terminálásra szükség lehet.



Zöld trió

Javasolt vetésidő:



Július, augusztus, szeptember, október

Javasolt vetésnorma kg/ha:

15 20 25 30 35

Tenyészdő:

60-90 nap

Hatás: (téli) talajtakarás, erózióvédelem

Utóvetemény: kalászos kukorica, szója, napraforgó

Elővetemény: repce, kalászos

Vetési mélység: 2-3 cm sorvetőgéppel | 25kg

szórva vetés esetén is javasolt a sekély bedolgozás | 30kg

Összetétel:

- 64% pohánka
- 12% facélia
- 24% bíborhere

Jellemzők:

- Korai és kései vetésre is alkalmas
- Jól alkalmazható aszályosabb területeken is
- Jó tápanyagfeltáró és megőrző képességgel rendelkező komponensek
- Fonálféreg gyérítő hatás
- Kiváló talaj szerkezetjavító hatás
- Könnyen kifagyó és bedolgozható keverék

Terminálás:

Kémiai/mechanikai

Növényvédelem:

Nem termelő célú takarónövény állományt nem célszerű és nem gazdaságos növényvédő szerrel kezelni. Herbiciddel végrehajtott terminálásra szükség lehet.



Zümmögő zöld

Javasolt vetésidő:



Augusztus – szeptember

Javasolt vetésnorma kg/ha:

15 20 25 30 35

Tenyészdő:

60-90 nap

Hatás: (téli)talajtakarás, erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Utóvetemény: kukorica, napraforgó

Elővetemény: repce, kalászos

Vetési mélység: 2-3 cm sorvetőgéppel | 25kg

szórva vetés esetén is javasolt a sekély bedolgozás | 30kg

Összetétel:

- 40% szöszös bükköny
- 16% facélia
- 44% pohánka

Jellemzők:

- Alkalmas korai és kései vetésre
- Fonálféreg gyérítő hatással rendelkezik
- Részben kifagyó állományt képez
- A talaj felső (0-30 cm) rétegében tartja a tápanyagokat
- Könnyen bedolgozható

Terminálás:

Kémiai / mechanikai. Könnyen bedolgozható keverék.

Növényvédelem:

Nem termelő célú takarónövény állományt nem célszerű és nem gazdaságos növényvédő szerrel kezelni. Herbiciddel végrehajtott terminálásra szükség lehet.



Mézelő zöldítő

Javaolt vetésidő:



Augusztus, október

Javaolt vetésnorma kg/ha: 15 20 25 30 35

Tenyésidő: 60-90 nap

Hatás: (téli) talajtakarás, erózióvédelem, szerkezetjavítás

Utóvetemény: kukorica, napraforgó, kalászos, szója

Elővetemény: kalászos

Vetési mélység: 2-3 cm sorvetőgéppel | 15kg

..... szórva vetés esetén is javasolt a sekély bedolgozás | 20kg

Összetétel:

- 51% fehér mustár
- 49% facélia

Jellemzők:

- Könnyen kezelhető keverék
- Alacsony dózissal vethető
- Talajlazító hatás az aktív gyökerek jelenléte révén
- Fonálféreg gyérítő hatás

Terminálás:

Mechanikai

Növényvédelem:

Nem termelő célú takarónövény állományt nem célszerű és nem gazdaságos növényvédő szerrel kezelni.



Nyári zöld

Javaolt vetésidő:



Augusztus – szeptember

Javaolt vetésnorma kg/ha: 5 10 15 20 25

Tenyésidő: 60-120 nap

Hatás: (téli) talajtakarás, erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Utóvetemény: kalászos, kukorica, napraforgó, repce

Elővetemény: kalászos, keresztesvirágú, napraforgó

Vetési mélység: 2-3 cm sorvetőgéppel | 10kg

..... szórva vetés esetén is javasolt a sekély bedolgozás | 15kg

Összetétel:

- 49% alexandriai here
- 51% facélia

Jellemzők:

- Minden talajtípusra ajánlható
- Könnyen kezelhető
- Két komponensű keverék
- Aktív gyökerek, elősegítik a megfelelő pórusméret kialakulását
- Talajlazító hatás

Terminálás:

Kémiai / mechanikai.

Növényvédelem:

Nem termelő célú takarónövény állományt nem célszerű és nem gazdaságos növényvédő szerrel kezelni. Herbiciddel végrehajtott terminálásra szükség lehet.



Talajvédő

Javasolt vetésidő:



Augusztus – szeptember

Javasolt vetésnorma kg/ha: 20 25 30 35 40

Tenyészeitő: 60-90 nap

Hatás: (téli) talajtakarás, erózióvédelem

Utóvetemény: kukorica, napraforgó

Elővetemény: repce

Vetési mélység: 2-3 cm sorvetőgéppel | 30kg

szórva vetés esetén is javasolt a sekély bedolgozás | 35kg

Összetétel:

- 43% rozs
- 15% facélia
- 32% bíborhere
- 10% pannon bükköny

Jellemzők:

- Kiváló téli talajtakarást biztosít
- Az élő gyökerek elősegítik az erózióvédelmet és a szerkezetjavítást

Terminálás:

Kémiai / mechanikai.

Növényvédelem:

Nem termelő célú takarónövény állományt nem célszerű és nem gazdaságos növényvédő szerrel kezelni. Herbiciddel végrehajtott terminálásra szükség lehet.

- A rendkívül magas pillangósvirágú komponens arány tápelemben gazdagítja a talajt



Öko zöld

Javasolt vetésidő:



Augusztus – szeptember

Javasolt vetésnorma kg/ha: 20 25 30 35 40

Tenyészeitő: 60-120 nap

Hatás: (téli) talajtakarás, erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Utóvetemény: repce, kukorica, napraforgó

Elővetemény: repce

Vetési mélység: 2-3 cm sorvetőgéppel | 30kg

szórva vetés esetén is javasolt a sekély bedolgozás | 35kg

Összetétel:

- 60% homoki zab
- 30% tavaszi bükköny
- 10% alexandriai here

Jellemzők:


- Nyári vetésre alkalmas

Terminálás:

Kémiai/mechanikai

Növényvédelem:

Nem termelő célú takarónövény állományt nem célszerű és nem gazdaságos növényvédő szerrel kezelni. Herbiciddel végrehajtott terminálásra szükség lehet.



Ugar keverékek



Bővebb
információkat
találhatsz
honlapunkon
Ugar
keverékeinkről

Ugar keverékek

Alkotó elemeiknek köszönhetően kiváló talajtakarást biztosítanak. Védnek az erózió ellen, javítják a talajéletet, valamint szerepet játszanak a talaj tápanyagtartalmának megőrzésében és gyarapításában.



Zöld ugar

Javasolt vetésidő:



március eleje; augusztus második fele

Javasolt vetésnorma kg/ha:

15 20 25 30 35

Hatás: talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Elővetemény: repce, kalászos, kukorica, napraforgó

Utóvetemény: kalászos, kukorica, szója, napraforgó

Összetétel:

- 45% lucerna
- 50% olaszperje
- 5% bíborhere



AKG ugar szálas

Javasolt vetésidő:



március eleje; augusztus második fele

Javasolt vetésnorma kg/ha:

15 20 25 30 35

Hatás: talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Utóvetemény: kalászos, kukorica, szója, napraforgó

Elővetemény: repce, kalászos, kukorica, napraforgó

Összetétel:

- 60% lucerna
- 28% bíborhere
- 8% vöröshere
- 4% fehérhere



Takarékos ugar

Javasolt vetésidő:



augusztus-október első fele

Javasolt vetésnorma kg/ha:

15 20 25 30 35

Javasolt kaszálás:

- jan. 01- aug. 31 között kétszer, a kaszálékot a területen hagyva
- aug. 31.-e után őszi kaszálás már lehordható.

Összetétel:

- 50% angol perje
- 30% olaszperje
- 10% lucerna
- 10% bíborhere



AKG

AÖP

Tavaszi ugar

Javasolt vetésidő:



március, október első fele

Javasolt vetésnorma kg/ha:

10 15 20 25 30

Tenyészdő:

3 év

Hatás: talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, gyomelnyomás

Összetétel:

- 10% szarvaskerep
- 80% olaszperje
- 10% bíborhere



A Tavaszi ugar keverékünket azoknak a gazdálkodóknak állítottuk össze, akik lucerna helyett, egyéb alternatívával szeretnék ugarterületet, táblaszegélyt létrehozni.

Amennyiben tavaszi vetésre kényszerülünk, ideálisabb megoldást, rövidebb idő alatt megfelelő talajborítást biztosít.

A keverék legnagyobb arányú összetevője az olaszperje, amellyel gyorsan, könnyen, biztonságosan stabil talajtakarás érhető el. A szarvaskerep gyorsan sarjadó, igénytelen, hosszú életű, szárazságtűrő, évelő szálaspillangós takarmánynövény. A harmadik összetevő a nitrogéngyűjtő részarányt emelő, jól megszokott bíborhere.

Ugar keverékünkben a pillangós komponens a szarvaskerep és a bíborhere képezi, amelyek nagy mennyiségű nitrogént kötnek meg. Az olaszperje jó talajtakaró faj, amely megakadályozza az eróziót és a gyomosodást.



AKG

Sorköz- takarók



Bővebb
információkat
találhatsz
honlapunkon
Sorköztakaró
keverékeinkről

Sorköztakaró keverékek

A sorköztakaró keverékeinket azoknak a gazdálkodóknak állítottuk össze, akik védeni szeretnék az ültetvényeik talaját a szél és víz erózióval szemben.



Zöld takaró 1 | Gyümölcsösbe

Javasolt vetésidő:

JAN FEB MÁR APR MÁJ JÜN JÜL AUG SZE OKT NOV DEC

március eleje; szeptember második fele - október

Javasolt vetésnorma kg/ha: 15 20 25 30 35

Hatás: talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés, gyomelnyomás

Összetétel:

- 60% angolperje
- 17% olaszperje
- 10% fehérhere
- 9% nádképű csenkesz
- 4% csomós ebír



Zöld takaró 2 | Szőlőbe és gyümölcsösbe

Javasolt vetésidő:

JAN FEB MÁR APR MÁJ JÜN JÜL AUG SZE OKT NOV DEC

március eleje; szeptember második fele - október

Javasolt vetésnorma kg/ha: 15 20 25 30 35

Hatás: talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés, gyomelnyomás

Összetétel:

- 30% vörös csenkesz
- 25% nádképű csenkesz
- 15% alexandriai here
- 15% fehérhere
- 12% angolperje
- 3% szarvaskerep



ÖMKI Élősorköz | Szőlőbe

Javasolt vetésidő:

JAN FEB MÁR APR MÁJ JÜN JÜL AUG SZE OKT NOV DEC

március eleje; szeptember második fele - október

Javasolt vetésnorma kg/ha: 15 20 25 30 35

Hatás: talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés, gyomelnyomás

Összetétel:

- 30% komlós lucerna
- 25% szarvaskerep
- 25% fehérhere
- 10% lándzsás útifű
- 5% tarka koronafűrt
- 5% vadmurok



Összetételüknek köszönhetően jól tűrik a taposást, a terület nagyobb csapadékot követően is bejárható, így elvégezhetőek a szükséges munkálatok.



Méh-és vadlegelő keverékek



Bővebb
információkat
találhatsz
honlapunkon
Méh-és vadlegelő
keverékeinkről

Méh- és vadlegelő keverékek

A szántóföldek mellé telepített méhlegelők virágzó összetevőikkel magukhoz csalogatják azokat az élőlényeket, amelyek létfontosságúak a természet egészséges egyensúlyának fenntartásában.



Egyéves méhlegelő

Javasolt vetésidő:



Fővetésben: március-április közepe,
másodvetésben szeptember-október

15 20 25 30 35

Javasolt vetésnorma kg/ha:

Tenyészdíó felhasználási cél szerint

Terminálás: kifagyás / mechanikai

Milyen területekre ajánlott? Ültetvények sorába, szélébe. Lejtőkre. Nehezen művelhető, csekély termőrétegű területekre. A tábla nehezen művelhető, fák által árnyékolt részére.

Plusz hatás: talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Összetétel:

- 30% facélia
- 20% bíborhere
- 10% pohánka
- 10% fehér mustár
- 10% alexandriai here
- 10% olajretek
- 5% pannon bükköny
- 5% vöröshere



Évelő méhlegelő (Syngenta)

Javasolt vetésidő:



március, augusztus-szeptember eleje

Javasolt vetésnorma kg/ha:

15 20 25 30 35

Tenyészdíó: 3-4 év

Technológia: Az utolsó kaszálást szeptember végéig javasolt elvégezni, 10 cm-es tarlómagassággal. Az állomány sávok kaszálásával elérhető, hogy az egész vegetációs évben legyen virágzó terület.

Milyen területekre ajánlott? Ültetvények sorába, szélébe. Lejtőkre. Nehezen művelhető, csekély termőrétegű területekre. A tábla nehezen művelhető, fák által árnyékolt részére.

Plusz hatás: talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Összetétel:

- 20% pohánka
- 17% baltacim
- 15% facélia
- 13% vöröshere
- 10% lucerna
- 10% bíborhere
- 5% fehérhere
- 5% mustár
- 5% alexandriai here



Évelő vadlegelő (Syngenta)

Javasolt vetésidő:



március, augusztus-szeptember eleje

Javasolt vetésnorma kg/ha:

15 20 25 30 35

Tenyészdő:

3-4 év

Technológia: Az utolsó kaszálást szeptember végéig javasolt elvégezni, 10 cm-es tarlómagassággal. Az állomány sávos kaszálásával elérhető, hogy az egész vegetációs évben legyen virágzó terület.

Milyen területekre ajánlott? Erdők közötti vadföldekre. Vadjárta táblák szegélyére, közepére (ökológiai folyosónak). Különböző termesztett kultúrák között, mezsgyének.

Plusz hatás: talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Összetétel:

- 20% vöröshere
- 15% pohánka
- 15% baltacim
- 12% lucerna
- 10% bíborhere
- 7% alexandriai here
- 7% fehérhere
- 5% szarvaskerep
- 3% évelő rozs
- 3% réti komócsin
- 3% angolperje



Keveréseinket úgy alakítottuk ki, hogy mindig legyen köztük virágzó növény, így folyamatos táplálékforrást biztosítanak a méheknek és más rovaroknak. Nem igényelnek különleges gondozást, így nem vesznek el időt az egyéb kultúrák fenntartásától. A bennük található növények elősegítik a talaj szerkezetének, valamint tápanyag- és vízmegkötő képességének javítását.





OperationPollinator®
Multifunctional Landscapes

syngenta®

Vadlegelő nagyvadas területen

- Vadlegelőnek alkalmas növénykeverék
- Folytonos táplálkozóhelyet biztosít a nagyvadaknak
- Csökkenti a vadkárt a szomszédos mezőgazdasági területeken
- Más növényeknél megbízhatóbb és változatosabb táplálék
- A téli széna, szenázs szükséglet megtermelhető
- Megtérülő bekerülési és fenntartási költségek



Vetőmag forgalmazó:

Lajtamag Kft.,

9246 Mosonudvar, Bereki u. 1.

E-mail: info@lajtamag.hu



Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200 •
info.hungary@syngenta.com • www.syngenta.hu •
f syngentaagrarklub • @ syngenta_magyarország



Zöldtrágya növények



Bővebb
információkat
találhatsz
honlapunkon
Zöldtrágya
növényeinkről

Facélia

Kedvelt mézelő növény. Kezdeti fejlődése kissé lassú, de később ugrásszerűen fejlődésnek indul. Bundaszerű állománya jó talajtakaró és gyomelnyomó. Ősszel és tavasszal (téli mulcstakarás) is leforgatható. Zöldtömege és finom gyökérzete könnyen elbomlik. Kertészeti kultúrák előtt is kiváló takarmánynövény.



Liza (saját fajta)

Javaolt vetésidő:



Fővetésben: március

Másodvetésben zöldtrágyának

• őszi leforgatással: július-augusztus

• tavaszi leforgatással: augusztus közepétől – szeptember közepéig

Javaolt vetésnorma zöldtrágyaként kg/ha: 15 20 25 30 35

Ezermagtömeg: 1,3-1,5 g

Virágzási idő: korai

Jellemzők:

- Növénymagassága 70-75 cm
- Jó állóképesség
- Virágszín: kékesibolya
- Közepes növekedési erély
- Felálló típus
- Zöldtrágyaként 30-35 t/ha zöld biomassza hozam

Fehér mustár

A legelterjedtebb, rövid tenyészidejű, hosszúnappalos zöldtrágyanövény. Szélsőséges adottságú talajok kivételével minden talajon vethető. Sűrű növényállománya gátolja a talajeróziót és kiváló gyomelnyomó hatású. Erőteljes gyökere megakadályozza a nitrogén bemosódását, és a talajfelszín közelében tartja azt.



Marci (saját fajta)

Javaolt vetésidő:



Fővetésben: március

Másodvetésben zöldtrágyának:

augusztus közepétől – szeptember közepéig

Javaolt vetésnorma zöldtrágyaként kg/ha: 15 20 25 30 35

Ezermagtömeg: 6,1-6,3 g

Virágzási idő: korai

Jellemzők:

- Alacsony erukasav tartalom
- Túlérésben pergésre kissé hajlamos
- Növénymagassága 128-135 cm
- Kiváló állóképesség
- Erős oldalhajtásképződés
- Zöldtrágyaként 8-12 t/ha zöld biomassza hozam



A jó zöldtrágya növények lágyszárúak, rövid tenyészidejűek, a csírázáshoz, illetve a kezdeti fejlődéshez kevés vizet igényelnek, gyors növekedésűek, dúsan és mélyen gyökereznek, nagy zöldtömeget adnak, takarják a talajfelszínt, jó tápanyagfeltáró és -mobilizáló hatásúak.

Olajretek

Nagy zöld- és gyökértömeget adó, kiváló szervesanyagpótló zöldtrágyanövény. Mélyreható, erős gyökérzete lazítja a talajt, valamint gyéríti a nematódák számát. Kedvezőtlenebb talaj- és éghajlati viszonyok között is megfelelően fejlődik. Hosszúnapos növény.



Anna (saját fajta)

Javasolt vetésidő:



Fővetésben: március

Másodvetésben zöldtrágyának:
augusztus közepétől – szeptember közepéig

Javasolt vetésnorma zöldtrágyaként kg/ha: 15 20 25 30 35

Ezermagtömeg: 8 g

Virágzási idő: nagyon korai-korai

Jellemzők:

- Növénymagassága 114-124 cm
- Erős oldalhajtásképződés
- Kiváló állóképesség
- Zöldtrágyaként 40-45 t/ha zöld biomassza hozam
- Kevert virágszín (fehér, lila és tarka szíromlevelű virágok)

Pohánka

Gyors növekedésű, nagy zöldtömeget, illetve gyökértömeget fejlesztő, alacsony igényű növény. Zöldítésben betöltött szerepe jelentős, elsősorban keverék komponensként használhatjuk ki pozitív hatásait.



Hajnalka

Javasolt vetésidő:



Fővetésben: május-június

Másodvetésben zöldtrágyának:
július

Javasolt vetésnorma zöldtrágyaként kg/ha: 50 55 65 70 75

Ezermagtömeg: 17-25 g

Jellemzők:

- Tenyészideje 90-110 nap
- Magtermését 70-75 napra hozza
- Kiváló gyomelnyomó
- Szárazságot jól tűri
- Keléstől számítva 40-45 napra virágzik



Egyes növényfajok más-más előnyös tulajdonsággal rendelkeznek.

Azért, hogy ezeket minél szélesebb körben lehessen kihasználni, érdemes a zöldtrágya növények keverékét alkalmazni és a jellemző tulajdonságokat a keverék összeállításakor figyelembe venni.



Homoki zab

Egy elfagyó, gyorsan nagy szervesanyag mennyiséget produkáló gabonafajta. Nagyon ellenálló, gyengébb talajokon relatíve kis mennyiségű csapadékkal is jó eredményt produkál. A gyökérzete erőteljes, a gyomelnyomó hatása is erős. A keverékeknek nagyon hasznos alkotóeleme, a magasabb növekedésű összetevők közé tartozik. Mint a zabfélék általában, kifejezetten érzékeny a talajban maradó gyomirtószer-maradványokra. Leginkább a homokos és vályogos talajokat kedveli, de a nehézaggyal talajokon is megél. Az árnyékot nem, a szárazságot azonban jól tolerálja.



Luxurial

Javasolt vetésidő:



Vetőmagtermelés esetén: március
Zöldítésnél: júliustól - októberig

Javasolt vetőmag mennyiség

fonálféreg elleni védekezés esetén kg/ha: 70 80 90 110 120 130

zöldítés esetén kg/ha: 30 40 50 60 70

Jellemzők:

- Gyors növekedés jellemzi
- Jó gyomelnyomó képességű
- A szöveti elbomlásakor a talajba jutó anyagok gátolják az aprómagvú gyomok csírázását
- Hatékony a fonálféreg kontrollálására

Négermag

Gyors növekedésű, nagy zöldtömeget biztosító takaró növény, amely kiválóan tolerálja a meleg, száraz körülményeket. Erőteljes, mélyre hatoló karógyökere van. Elsősorban zöldtrágya keverékek komponense.



Négermag

Javasolt vetésidő:



július

Javasolt vetésnorma kg/ha: 6 7 8 9 10 11

Vetési mélység: 2-3 cm-re

Virágzási idő: közepes

Jellemzők:

- Korai fagyok károsítják
- Gyors növekedés
- Csírázáshoz csak kevés nedvesség szükséges
- Jó gyomelnyomó képesség
- Ajánlott bedolgozási időszak: virágzás



A termékeny talaj a sikeres gazdálkodás alapkövetelménye. A zöldtrágyanövények termesztése, majd megfelelő időben történő aláforgatása javítja a terhelt, tömörödött talajok szerkezetét, növeli a talaj termékenységet és egészségét, bővíti a beszűkült vetésforgót.

Meliorációs retek

Keresztes virágúak családjába tartozik. A zöldtrágyának elterjedten alkalmazott olajretekkel szemben nem képez nagy zöld tömeget, hanem annál mélyebre hatoló, erőteljes gyökérzetet növel (egyes megfigyelések szerint akár 70 %-kal nagyobb gyökértömeget is képezhet). Ezt a tulajdonságát használhatják ki azok a gazdaságok, ahol forgatás nélküli technológiát alkalmaznak.



Meliorációs retek

Javasolt vetésidő:

JAN FEB MÁR APR MÁJ JÜN JÚL AUG SZE OKT NOV DEC

július közepétől szeptember elejéig

Javasolt vetésnorma kg/ha:

4 5 6 7 8 9

Vetési mélység: 0,5-2 cm-re, vetőgéppel

Virágzási idő: közepes

Jellemzők:


- -4 és -7°C között elfagy
- Fagyban hengerezéssel, vagy tárcsázással nagyon jól terminálható
- Magas cukortartalmánál fogva a talaj mikroorganizmusokat tápanyaggal látja el

TALAJTAKARÁS TÁPANYAGMEGKÖTÉS TALAJSZERKEZET JAVÍTÁS



FÉMZÁROLT VETŐMAGKEVERÉKEK

- zöldtrágya keverék ökológiai másodvetéshez
- ugarkeverék
- takarónövény keverék (szőlőbe, gyümölcsösbe)
- méhlegelő keverék
- vadlegelő keverék




Pillangósok



Bővebb
információkat
találhatsz
honlapunkon
Pillangós
növényeinkről

Lucerna

Egyik legfontosabb takarmánynövényünk. Nemcsak nagy a fehérjetartalma, de fehérjéjének nagyon jó a biológiai értéke. A közvetlen takarmányozási jelentőségén kívül a lucerna felhasználható a biológiai talajművelésben, mivel előnyösen hat a talajok termékenységére. Fejlett gyökérzete nitrogénben és szerves anyagban gazdagítja a talajt.



Eride (saját fajta)

Javasolt vetésidő:



március, illetve augusztus-szeptember

Javasolt vetésnorma kg/ha: 15 20 25 30 35

Ezermagtömeg: 2-2,2 g

Jellemzők:

- Kiváló takarmányérték
- Levél-szár arány meghaladja az 50%-ot
- Virágszíne tarka (a fehér, a füst, a zöldes-sárga, a kék és a lila bármely árnyalatában előfordulhat)
- A legtöbb gombás betegséggel szemben toleráns
- Télállósága jó
- Gyorsan újra sarjad

Bíborhere

Az alternatív növények szerepe a vetésszerkezetben megkérdőjelezhetetlen, kiváló példa erre a bíborhere. Áttelelő pillangós virágú szálastakarmány, amely javítja a talaj termékenységét és jól mézel.



Lovászpatonai

Javasolt vetésidő:



augusztus vége – szeptember közepe

Javasolt vetésnorma kg/ha: 15 20 25 30 35

Jellemzők:

- Korai virágzás
- Rövid tenyészidő
- Jó bokrosodó képesség
- Lisztharmatra nem érzékeny
- Magas növésű fajta



A keresztesvirágúak fontos nektár- és pollentermelők a méheknek



Vöröshere

Évelő, pillangósvirágú takarmánynövény, melynek gyökérzete akár 60 cm-re is lenyúlhat a talajba, így értékes talajjavító hatása van.



Vöröshere

Javasolt vetésidő:

JAN FEB MÁR APR MÁJ JÜN JÜL AUG **SZE** OKT NOV DEC

február-március, augusztus vége-szeptember

Javasolt vetésnorma kg/ha: 15 20 **25** 30 35

Tenyészdő: 3-4 év

Jellemzők:

- Kiváló talajjavító
- Magas fehérjetartalmú növény
- Magas takarmányértékű
- Nagy zöld és szárazanyag hozamot tud biztosítani

Fehérhere

Kiváló gyomelnyomó és méhlegelő, szinte minden talajon telepíthető. Mélyre hatoló gyökérzete javítja a talaj minőségét. Kiváló választás legelők javítására.



Fehérhere

Javasolt vetésidő:

JAN FEB **MÁR** APR MÁJ JÜN JÜL AUG **SZE** OKT NOV DEC

március, augusztus vége-szeptember

Javasolt vetésnorma kg/ha: 05 **10** **15** 20 25

Tenyészdő: 3-4 év

Jellemzők:

- Erőteljes hajtás és levélképződés jellemzi
- Alacsony hőmérsékletet is jól tűri
- Magas zöldhozamú
- Magas takarmányértékű



A pillangós virágúak a legtöbb zöldtrágya keverék kihagyhatatlan elemei. Értéküket nitrogénkötő képességük és gyökertrágya hatásuk adja. A legtöbb vetésforgóba jól beilleszthetők. Továbbá a pillangósok C:N aránya igen kedvező, amely gyors lebomlást tesz lehetővé, és amely virágzást követően is megmarad. Kiváló talajlazító hatást érnek el. Ezek a növények kezdetben lassan fejlődnek, ezért olyan növényekkel érdemes párosítani, amelyek védik őket ebben az időszakban, de később teret adnak számukra.



Farmet

 **LEMKEN**

Precíziós vetéstechnika az ANDEST-2005 Kft. kínálatából:

Farmet Falcon PRO
pneumatikus vetőgépek

Farmet Falcon Compact
pneumatikus vetőgépek

Lemken Saphir
mechanikus vetőgépek

Lemken Solitair
pneumatikus vetőgépek

Hagyományos vagy csökkentett menetszámú technológiák.
3-12 méteres munkaszélesség, ISOBUS kapcsolat, műtrágya kijuttatás,
vetés máktól a lóbabig.

www.farmethungary.com

www.andest.hu

Dr. Szabados Tamás
+36 30 198 4898

Gyurcsik Zsolt
+36 70 411 8204

Csáki Miklós
+36 30 509 7378

Lőkös Gábor
+36 30 537 3154





Hüvelyesek



Bővebb
információkat
találhatsz
honlapunkon
Hüvelyes
növényeinkről

Tavaszi bükköny

Európa mediterrán területeiről származó egynyári növény. Talajra nem igényes, leginkább támasztó növénynek vetik – zabbal vagy búzával. Nagy zöldtömeget adó takarmány- és takarónövény. Nagyfokú gyomelnyomó képesség jellemzi, valamint mulcsként is meghagyható a téli hónapokra.



Hanka

Javasolt vetésidő:



július második fele, augusztus

Javasolt vetésnorma kg/ha:



Jellemzők:

- Nagy tömegű zöldtakarmányt adó növény
- Jó gyomelnyomó
- Talaj iránt nem igényes
- Gyors és korai fejlődésű

Pannon bükköny

Takarmányértéke a bükkönyök között a legjobb. A talaj szempontjából igényes, a jobb termőképességű talajokat kedveli, viszont annak nitrogéntartalmát nagy mértékben gazdagítja.



Béta

Javasolt vetésidő:



október

Javasolt vetésnorma kg/ha:



Jellemzők:

- Középkorai virágzás
- Magas takarmányérték
- Talaj nitrogéntartalmát gazdagítja
- Virága piszkos fehér
- Meszes, laza szerkezetű talajokat kedveli
- Tenyészideje 36-40 hét
- Fagyálló

Borsó

A takarmányborsó egyike az első házasított növényfajtáknak. Tiszta vetésben termeszthető, vagy gyakrabban támasznövénynek (kalászos gabonával) keverve. Zöldtrágyaként történő felhasználása kedvezően hat a talajszerkezetre, javítja annak vízáteresztő képességét és növeli vízkapacitását. Értékes takarmánynövény.



Feroe

Javasolt vetésidő:



szeptember-október

Javasolt vetésnorma kg/ha:



Jellemzők:

- Középkorai egyenletes érés, korai hosszantartó virágzás
- Sárga magvú típus
- Baktériumos hervadás/pseudomonas betegséggel szemben rezisztens
- Magas fehérjetartalom
- Kiemelkedő mennyiségű zöldtömeg
- Könnyen betakarítható, stabil termőképesség jellemzi

Szója



Bővebb
információkat
találhatsz
honlapunkon
Szója
növényeinkről

Szója

A szója a hüvelyesek rendjébe tartozó kiemelkedően fontos haszonnövény. Takarmányozásra, kisebb mértékben emberi fogyasztásra és ipari alapanyagként is kiemelkedő jelentőséggel bír. A talaj iránt nem túlzottan igényes, biztos és jövedelmező termést azonban a tápanyagokban gazdag, jó vízellátottságú talajokon várhatunk.



RGT Stumpa

Javasolt vetésnorma csíra/ha: 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000

Növekedési típusa: féldeterminált

Köldök színe: szürke

Érés idő: igen korai, 000/00

Alsó hüvelymagasság: 10,5 cm

Jellemzők:

Átlagos fehérjetartalom

Kezdeti fejlődési erély

Szárszilárdság

Pergéssel szembeni tolerancia

Betegség ellenállóság:

Sclerotinia tolerancia

Peronoszpóra ellenállás



Bettina

Javasolt vetésnorma csíra/ha: 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000

Növekedési típusa: indeterminált

Köldök színe: fehér

Érés idő: igen korai, 000/00

Alsó hüvelymagasság: 13,2 cm

Jellemzők:

Átlagos fehérjetartalom

Kezdeti fejlődési erély

Pergéssel szembeni tolerancia

Betegség ellenállóság:

Peronoszpóra ellenállás

Sclerotinia tolerancia

Bakteriózisok

Vírusok



A hüvelyes növényeket nagyobb részt magvaikért termesztjük. Jelentőségük számottevő, mivel fehérjében gazdag magvaik fontos és értékes élelmiszerek, valamint zöld- és abraktakarmányok.



ES Mentor

Javasolt vetésnorma csíra/ha: 400.000 450.000 **500.000** **550.000** 600.000

Növekedési típusa: féldeterminált

Köldök színe: fehér

Érés idő: igen korai, 000/00


Alsó hüvelymagasság: 12,3 cm

Metribuzin hatóanyagú herbicid használata nem javasolt

Jellemzők:



Betegség ellenállóság:



Altona

Javasolt vetésnorma csíra/ha: 500.000 **525.000** **550.000** **575.000** 600.000

Növekedési típusa: indeterminált

Köldök színe: világos

Érés idő: igen korai, 000/00

Alsó hüvelymagasság: 15 cm

Jellemzők:



Betegség ellenállóság:



Egyes fajai és fajtái értékes zöldtrágya növények is, mivel nitrogénkötő képességük jelentős.



Tavaszi kalászos



Bővebb
információkat
találhatsz
honlapunkon
**Tavaszi
kalászosainkról**

Tavaszi árpa

A tavaszi árpát takarmányozás, sör- és malátagyártás céljára termesztjük. A két féle hasznosításon alapuló termesztés agrotechnikája kisebb mértékben eltér egymástól, de összességében elmondható, hogy a jó szerkezetű, jó vízellátottságú, középkötött talajokat kedveli. Gyökérzete gyengén fejlett, ezért könnyen felvehető tápanyagokra van szüksége.



Bojos

Javasolt vetésidő:



február közepe

Javasolt vetésnorma kg/ha: 140 160 180 200 220 240 260

Ajánlott csíraszám: 4-4,5 millió csíra/ha

Érés idő: középérés

Kalásztípus: kétsoros (sörárpa)

Jellemzők:

- Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában is elismert
- Kiváló malátázási paraméterek
- Magas termőképesség

Tavaszi búza

Vetésterületét elsősorban az határozza meg, hogy az őszi vetések mennyire voltak sikeresek. A népnyelv „ravasz” búzának is nevezi, mivel a később vetett növényállományok egyes fejlődési ciklusai lerövidülnek, kevesebb idő áll rendelkezésre a vegetatív és generatív részek kifejlődésére, vagyis a termésképződésre. A vetés eredményességét a termesztéstechnológiai oldalról a gyorsaság határozza meg, vagyis elvárás, hogy a vetés a lehető legkorábban történjen meg.



IS Jarissa

Javasolt vetésidő:



február vége, március első dekádja

Javasolt vetésnorma kg/ha: 150 160 170 180 190 200 210

Ajánlott csíraszám: 4-4,5 millió csíra/ha

Érés idő: koraiérésű

Kalásztípus: szálkás

Jellemzők:

- Szárazságtűrő fajta
- Levélbetegségekkel szemben jó ellenállóságot mutat
- Járó típus, ősszel is elvethető



A sokszínű tavaszi vetésforgó kialakításában játszhatnak nagy szerepet. Vetésterületük nagyságát elsősorban az őszi vetések sikeressége határozza meg.

Tavaszi zab

Kedvező beltartalmi paraméterei miatt kiváló abraktakarmány. Biológiai értéke, kémiai összetétele a gabonák között kiemelkedő. Kiváló a betegség-ellenállósága és egyéb kedvező tulajdonságai az ökológiai gazdálkodás egyik perspektivikus növényévé teszik. Gyengébb minőségű talajokkal szemben kevésbé érzékeny, viszont vízigénye nagyobb, mint a többi gabonáé.



Poseidon

Javasolt vetésidő:



február közepe, március közepe

Javasolt vetésnorma kg/ha:

150 160 170 180 190 200 210

Ajánlott csíraszám:

4-4,5 millió csíra/ha

Érés idő:

középérésű

Jellemzők:

- Hántolásra is alkalmas
- Kiváló szemtermés minőség
- Nagy ezerszemtömeg

Tengernyi lehetőséget kínálunk!



@lajtamag



facebook.com/lajtamag



lajtamag.hu



Az őszi vetésű növények között kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a kalászos gabonák. Nemcsak azért, mert stratégiai fontosságú növényeink, de azért is, mert az őszi kalászosok által elfoglalt vetésterület, az évente előállított árumennyiség és a megtermelt áru értéke nemzetgazdasági szinten sem elhanyagolható.

Őszi kalászos



Bővebb
információkat
találhatsz
honlapunkon
Őszi
kalászosainkról

Őszi árpa

Az őszi árpa a legkorábban érő gabonaféle, aratása teljes érésben, június első felében szokásos. Kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkezik, ezért a gyengébb termőhelyeket is jól hasznosítja. Korai betakarítása miatt aszályra hajlamos területeken az őszi búzánál biztonságosabb termést ad.



SU Ellen

Javasolt vetésidő:



szeptember vége - október eleje

Javasolt vetésnorma kg/ha: 140 160 180 200 220 240 260


Ajánlott csíraszám: 3,5-4 millió csíra/ha

Érés idő: középérés

Kalásztípus: hatsoros

Jellemzők:

- Betegség-ellenállósága nagyon jó
- Kiváló ökostabilitás, jó technológiai alkalmazkodóképesség
- Erőteljes felépítésű



Paradies

Javasolt vetésidő:



szeptember vége - október eleje

Javasolt vetésnorma kg/ha: 140 160 180 200 220 240 260

Ajánlott csíraszám: 3,5-4 millió csíra/ha

Érés idő: középérés

Kalásztípus: hatsoros

Jellemzők:

- Nagy termőképességű vírus rezisztens (BaYDV) takarmány árpa
- Árpa mozaik vírussal szembeni kimagasló a toleranciája
- Felkészítve a korai vetésekre és a nagy károsító nyomásra
- Szárszilárdítás nagyon intenzív termőhelyeken és technológiákban javasolt



Fascination

Javasolt vetésidő:



szeptember vége - október eleje

Javasolt vetésnorma kg/ha: 120 140 160 180 200 220 240

Ajánlott vetésnorma: korai vetésidő: 160-180 kg/ha

..... normál vetésidő: 180-190 kg/ha

..... megkésített vetésidő: 190-200 kg/ha

Ajánlott csíraszám: 3,5-4,2 millió csíra/ha

Érés idő: középkorai, korai kalászolás

Jellemzők:

- Nagy termés potenciál, egészséges állomány
- Árpa sárga törpülésvírus (BaYDV) rezisztencia
- Stabílan magas HL-súly

Őszi durumbúza

Az őszi durum fajták termesztésével nagy mennyiségű és jó technológiai minőségű malomipari alapanyag állítható elő. Minőségstabilitásuk kiváló, így termésük az évjáratok többségében biztonságosan értékesíthető a tésztaipar részére.



Lunadur

Javasolt vetésidő:



szeptember vége - október közepe

Javasolt vetésnorma kg/ha: 140 150 160 **170** **180** 190 200

Ajánlott csíraszám: 3,2-3,8 millió csíra/ha

Érés idő: koraiérésű

Jellemzők:

- Magas terméshozam és fehérje tartalom
- Magas esésszám
- Rendkívül tetszetős, nagy szemű fajta



Amidur

Javasolt vetésidő:



szeptember vége - október közepe

Javasolt vetésnorma kg/ha: 140 **180** **190** **200** **210** **220** **230**

Ajánlott csíraszám: 3,5-4 millió csíra/ha

Érés idő: későiérésű

Jellemzők:

- Magas növénymagasság és jó egészségi állapot jellemzi
- A búza törpevírussal szemben rezisztens
- Jó a sárgarozsda, barnarozsda és lisztharmat elleni ellenálló állóképessége



Az őszi árpa a legkorábban érő gabonaféle, aratása teljes érésben, június első felében szokásos. Kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkezik, ezért a gyengébb termőhelyeket is jól hasznosítja. Korai betakarítása miatt aszályra hajlamos területeken az őszi búzánál biztonságosabb termést ad.



Őszi búza

A világ egyik legértékesebb és legnagyobb területen termesztett gabonaféléje a búza. Széles körű elterjedését a búzafajok és fajták változatos éghajlati igénye és jó alkalmazkodóképessége tette lehetővé. Magyarország talajai és éghajlata alkalmas a gabonafélék termesztésére, jó minőségű búza állítható elő. A megtermelt búza jelentős része őrlésre és takarmányozásra alkalmas.



Falado

Javasolt vetésidő:



szeptember vége - október vége

Javasolt vetésnorma kg/ha: 150 160 170 180 190 200 210

Ajánlott csíraszám: 4-4,5 millió csíra/ha

Minőség: B1-B2 (malmi)

Érés idő: korai érésű

Kalásztípus: szálkás

Jellemzők:

- Betegségekkel, megdőléssel szemben ellenálló
- Átlagos fehérje tartalma 12-13,5%, kiváló a fehérje minősége
- Rendkívül magas terméspotenciállal bír, eltérő évjáratok és körülmények között



Sy Passion

Javasolt vetésidő:



szeptember vége - október vége

Javasolt vetésnorma kg/ha: 170 180 190 200 210 220 230

Ajánlott csíraszám: 3,8-4,5 millió csíra/ha

Minőség: B1-B2 (malmi)

Érés idő: középkorai érésű

Kalásztípus: szálkás


Jellemzők:

- Középmagas méretű
- Magas és stabil terméspotenciál
- Kifejezetten jó betegség-ellenállóságú
- Intenzív termesztési körülmények közé ajánlott
- Sárgarozsda elleni toleranciája kiemelkedő



Alicantus

Javasolt vetésidő:



szeptember vége - november vége

Javasolt vetésnorma kg/ha: 160 170 180 190 200 210 220

Ajánlott csíraszám: 3-4 millió csíra/ha

Minőség: A1-A2 (malmi)

Érés idő: korai érésű

Kalásztípus: szálkás

Jellemzők:

- Betegségellenállósága kitűnő, levél- és sárgarozsdára rezisztens
- Magas ezermagtömeg
- Termése még a malmi sztenderdekét is meghaladja



Activus

Javasolt vetésidő:



szeptember közepe - november közepe

Javasolt vetésnorma kg/ha: 160 170 180 190 200 210 220

Ajánlott csíraszám: 3,5-4 millió csíra/ha

Minőség: A2 (malmi)

Érés idő: koraiérésű

Kalásztípus: szálkás

Jellemzők:

- Közepes termetű
- Magas termőképesség
- Jó beltartalmi értékek, kiváló malmi minőség
- Kedvező agronómiai tulajdonságok
- Betegség ellenállósága jó
- Gabonalisztharmattal és levélfuzáriummal szemben rezisztens
- Szár- és sárgarostszármal szemben is mérsékelten rezisztens



Tiberius

Javasolt vetésidő:



szeptember közepe - november közepe

Javasolt vetésnorma kg/ha: 160 170 180 190 200 210 220

Ajánlott csíraszám: 3-4 millió csíra/ha

Minőség: A2 (malmi)

Érés idő: középérésű

Kalásztípus: szálkás


Jellemzők:

- Kiemelkedő szárszilárdság
- Magas sütőipari érték
- Igen magas fehérje és sikértartalom
- Kötőbetegség ellenállóság, főleg kalászfuzárium ellen



Bologna

Javasolt vetésidő:



szeptember vége - október vége

Javasolt vetésnorma kg/ha: 130 140 150 160 170 180 190

Ajánlott csíraszám: 4-4,5 millió csíra/ha

Minőség: A1-A2 (malmi)


Érés idő: koraiérésű

Kalásztípus: szálkás

Jellemzők:

- Javító búzafajta - jó termés, stabilan kiemelkedő minőséget adó fajta
- Alacsony ezermagtömeg
- Alacsonyabb növényállomány jellemzi - 70 cm
- Jól reagál a minőségjavító, osztott N kijuttatásra
- Jó betegség ellenállóság jellemzi
- Kimagaslóan jó esésszárműveléssel rendelkezik
- Kiváló lisztharmat tolerancia
- Kalászfuzárium-ellenállósága átlagos

Értékesítés, termeltetés



Értékesítőink

1

Dr. Nagy Ida

+36 30 377 4388
nagy.ida@lajtamag.hu

2

Kovács Gábor

+36 30 293 3186
kovacs.gabor@lajtamag.hu

3

Turnyánszki Ferenc

+36 30 483 4556
turnyanszki.ferenc@lajtamag.hu

Értékesítés támogatók

Okos Szilveszter

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád

+36 30 587 7807
okos.szilveszter@lajtamag.hu

Seres Tibor

Békés, Csongrád-Csanád,
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Bács-Kiskun

+36 30 659 6375
seres.tibor@lajtamag.hu

Kapcsolat



 @lajtamag

 facebook.com/lajtamag

Lajtamag Kft.
9246 Mosonudvar, Bereki u. 1.
+36 96 / 578 280
info@lajtamag.hu

lajtamag.hu

